



Postpartum Thyroiditis

What is postpartum thyroiditis?

Postpartum thyroiditis is an inflammation of the thyroid gland (located in the neck just below the Adam's apple). It usually occurs within a year after a woman gives birth. It affects five to ten out of every 100 women after they deliver a baby. There are usually two phases of the disease—*hyperthyroidism* (too much thyroid hormone) and *hypothyroidism* (too little thyroid hormone).

In the usual first phase—*hyperthyroidism*—the inflamed thyroid gland leaks stored thyroid hormone (which consists of T3 and T4) into the blood. This phase usually lasts 2 to 4 months. Too much thyroid hormone in your blood causes your metabolism to speed up. Metabolism is how your body uses and stores energy. Symptoms can include:

- Losing weight suddenly
- A fast heartbeat
- Tiredness
- Feeling nervous
- Sweating
- Sensitivity to heat

Inflammation can damage the thyroid, making it less able to produce thyroid hormone. This can lead to the second phase—*hypothyroidism*. This phase may last up to a year. Too little thyroid hormone in your blood slows your metabolism. Many women with hypothyroidism have a goiter—an enlarged thyroid gland that causes swelling in the front part of the neck. Other symptoms of hypothyroidism can include:

- Unexplained weight gain or inability to lose weight
- Feeling tired or fatigued
- Depression

- Dry skin and brittle nails
- Hair loss
- Sensitivity to cold

- Levels of anti-thyroid antibodies (Inflammation of the thyroid causes your immune system to release antibodies in the bloodstream.)

What are the risks of postpartum thyroiditis?

You are at greater risk of developing postpartum thyroiditis if you have an immune system disorder such as type 1 diabetes, a personal or family history of thyroid problems (such as Graves' disease or Hashimoto's disease), or a previous history of postpartum thyroiditis.

Some women who develop hyperthyroidism after giving birth return to normal within a few months without going through the second phase (hypothyroidism). Most women, however, do experience the second phase. Of these women, about one out of five develops permanent hypothyroidism within 3 to 4 years. They require life-long treatment with thyroid hormone. If left untreated, hypothyroidism can cause serious problems such as heart disease.

How is postpartum thyroiditis diagnosed?

Diagnosis depends on the phase of the disease and is based on your symptoms and laboratory test results, including:

- Levels of T4 in the bloodstream
- Level of thyroid-stimulating hormone (TSH) (Produced by the pituitary gland, TSH stimulates the thyroid to produce T3 and T4.)
- Radioactive iodine uptake values (This test requires a patient to take a small dose of radioactive iodine by mouth and then measures the amount that builds up in the thyroid gland. This is not recommended for women who are nursing.)

How is thyroiditis treated?

In the first phase (*hyperthyroidism*), you usually don't need treatment because symptoms are mild and brief. If your symptoms are extreme, however, your doctor might give you a *beta blocker* (such as propranolol, atenolol, or metoprolol) to slow your heart rate and lessen nervousness.

In the second phase (*hypothyroidism*), you will receive thyroid hormone therapy if you develop symptoms. Levothyroxine is the product of choice. It is a synthetic (laboratory-made) form of T4 that is the same as the T4 the thyroid gland naturally makes. After 6 to 12 months, the medication is stopped to see whether your thyroid will function normally on its own. In most cases the thyroid returns to normal but some women do develop long-term hypothyroidism and need lifelong thyroid hormone replacement therapy.

What should you do with this information?

If you have recently delivered a baby and are having the symptoms listed above, you should talk with your doctor. Damage to the thyroid happens in both stages and hypothyroidism can lead to serious complications. An endocrinologist, a specialist in hormone-related conditions, can help diagnose and treat this condition.

Resources

Find-an-Endocrinologist:

www.hormone.org or call
1-800-HORMONE (1-800-467-6663)

American Thyroid Association:

www.thyroid.org
Medline Plus: www.medlineplus.gov/

EDITORS:

Jorge H. Mestman, MD
Robert C. Smallridge, MD, FACP
Leonard Wartofsky, MD, MACP
3rd Edition January 2009

For more information on how to find an endocrinologist, download free publications, translate this fact sheet into other languages, or make a contribution to The Hormone Foundation, visit www.hormone.org or call 1-800-HORMONE (1-800-467-6663). The Hormone Foundation, the public education affiliate of The Endocrine Society (www.endo-society.org), serves as a resource for the public by promoting the prevention, treatment, and cure of hormone-related conditions. This page may be reproduced non-commercially by health care professionals and health educators to share with patients and students.

© The Hormone Foundation 2005



Tiroiditis posparto (después del parto)

¿Qué es la tiroiditis posparto?

La tiroiditis posparto (después del parto) es una inflamación de la glándula tiroideas (ubicada en la parte anterior del cuello, debajo de la manzana de Adán). Normalmente, ocurre durante el primer año después de que la mujer ha dado a luz. Afecta entre cinco y diez de cada 100 mujeres después de haber tenido un bebé. Generalmente hay dos fases de la enfermedad: *hipertiroidismo* (nivel alto de hormonas tiroideas) e *hipotiroidismo* (nivel bajo de hormonas tiroideas).

Generalmente, la primera fase es el hipertiroidismo, en el cual la tiroideas inflamada tiene una excesiva secreción de hormonas tiroideas acumuladas (compuestas por T3 y T4), las cuales van a parar a la sangre. Esta fase normalmente dura entre 2 y 4 meses. Un nivel alto de estas hormonas en la sangre causa que el metabolismo del cuerpo se acelere. El metabolismo es la forma en que el cuerpo utiliza y almacena energía. Los síntomas pueden incluir:

- Pérdida de peso repentina
- Aceleramiento de los latidos cardíacos
- Cansancio
- Nerviosismo
- Sudores
- Sensibilidad al calor

La inflamación puede dañar la tiroideas, lo que hace que disminuya su capacidad de producir hormonas tiroideas. Esto puede llevar a la segunda fase: el hipotiroidismo. Esta fase puede durar hasta un año. Un nivel bajo de hormonas tiroideas en la sangre reduce el metabolismo. Muchas mujeres con hipotiroidismo tienen bocio, un engrandecimiento de la glándula tiroideas que produce una inflamación en la parte anterior del cuello. Otros síntomas pueden incluir:

- Aumento inexplicable de peso o incapacidad de perder peso
- Cansancio o fatiga
- Depresión

- Sequedad de la piel y uñas quebradizas
- Pérdida del cabello
- Sensibilidad al frío

- El nivel de anticuerpos antitiroideos (La inflamación de la tiroideas hace que el sistema inmunitario secrete anticuerpos en la sangre.)

¿Cuáles son los riesgos de la tiroiditis posparto?

Usted tiene mayor riesgo de sufrir una tiroiditis posparto si tiene un trastorno del sistema inmunitario como diabetes de tipo 1, antecedentes personales o familiares de haber tenido problemas con la tiroideas, como la enfermedad de Graves o tiroiditis de Hashimoto, o antecedentes médicos de haber sufrido previamente de tiroiditis posparto.

Algunas mujeres que desarrollan hipertiroidismo después de haber dado a luz vuelven a la normalidad a los pocos meses sin pasar a la segunda fase (el hipotiroidismo). Sin embargo, la mayoría de las mujeres pasa por la segunda fase. De estas mujeres, aproximadamente una de cada cinco desarrolla hipotiroidismo permanente después de 3 o 4 años y tendrá que ser tratada con hormona tiroidea por el resto de su vida. El hipotiroidismo puede producir graves problemas, tales como enfermedades cardíacas, si se deja sin tratar.

¿Cómo se diagnostica la tiroiditis posparto?

El diagnóstico depende de la fase de la enfermedad y se basa en sus síntomas y en los resultados de pruebas de laboratorio, entre ellas:

- El nivel de T4 en la sangre.
- El nivel de hormona estimuladora de la tiroideas (La TSH, por sus siglas en inglés, es producida por la glándula pituitaria y estimula a la tiroideas para que produzca T3 y T4.)
- Los valores de absorción de yodo reactivo (Esta prueba requiere que el paciente tome oralmente una pequeña cantidad de yodo reactivo, y después se mide la cantidad de yodo que se acumula en la glándula tiroideas. Esta prueba no es aconsejable para las mujeres que están amamantando.)

¿Cómo se trata la tiroiditis?

En la primera fase (hipertiroidismo), normalmente no se necesita ningún tratamiento porque los síntomas son leves y breves. Sin embargo, si los síntomas son extremos, su médico puede recetarle un *bloqueador beta* (como propranolol, atenolol o metoprolol) para reducir el ritmo de los latidos cardíacos y disminuir el nerviosismo.

En la segunda fase (hipotiroidismo), recibirá terapia con hormona tiroidea si tiene síntomas. El producto preferido es Levotiroxina, una forma sintética (fabricada en laboratorio) de T4 que es igual a la T4 producida naturalmente por la tiroideas. Al cabo de 6 a 12 meses, se detiene el medicamento para ver si la tiroideas funciona normalmente por sí misma. En la mayoría de los casos, la tiroideas vuelve a la normalidad, pero en algunos casos la mujer desarrolla hipotiroidismo a largo plazo y tiene que recibir terapia con reemplazo de la hormona tiroidea por el resto de su vida.

¿Qué debe hacer con esta información?

Si usted ha dado luz recientemente y está teniendo los síntomas enumerados anteriormente, debe consultar con su médico. La tiroideas se daña en ambas etapas, y el hipotiroidismo puede tener complicaciones graves. Un endocrinólogo, que es un especialista en trastornos hormonales, puede ayudar a diagnosticar y tratar esta enfermedad.

Recursos

Encuentre un endocrinólogo:

www.hormone.org o llame al
1-800-467-6663

Asociación de la Tiroides Estadounidense:

www.thyroid.org

Medline Plus: www.medlineplus.gov/

EDITORES:

Jorge H. Mestman, MD
Robert C. Smallridge, MD, FACP
Leonard Wartofsky, MD, MACP

3era edición Enero del 2009

Para más información sobre cómo encontrar un endocrinólogo, obtener publicaciones gratis de la Internet, traducir esta página de datos a otros idiomas, o para hacer una contribución a la Fundación de Hormonas, visite a www.hormone.org o llame al 1-800-HORMONE (1-800-467-6663). La Fundación de Hormonas, la filial de enseñanza pública de la Sociedad de Endocrinología (www.endo-society.org), sirve de recurso al público para promover la prevención, tratamiento y cura de condiciones hormonales. Esta página puede ser reproducida para fines no comerciales por los profesionales e instructores médicos que deseen compartirla con sus pacientes y estudiantes.

© La Fundación de Hormonas 2005